ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE:
The intended user should be a licensed medical professional, the patient or the patient's caregiver. The user should be able to read, understand and be physically capable of performing the directions, warnings and cautions in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS:
The Aircast XP Diabetic Walker system is designed to provide immobilization and protection of the foot. It may be suitable for plantar ulcerating and following stable fracture of the foot and/or ankle. Provides protection and, immobilization or controlled movement of the limb or body segment.

CONTRAINDICATIONS: This device is contraindicated for unstable fractures of the lower leg, ankle and foot. Dysplasia, Circulatitus, Pulmonary, Cardiovascular or Skeletal conditions which have risk to be made worse as a result of compression and/or pressure. If any of these conditions exist, such as non-operative Charcot or other abnormalities, that cause the shape of the foot to deviate excessively from its natural shape. Foot pathology requiring support of the bony structures.

WARNINGS AND PRECAUTIONS :
- This device is to be used under the supervision of a healthcare professional. The determination of when to apply the brace and the frequency and duration of use should be strictly at the discretion of the treating physician. Always consult with your physician before making changes to the brace.
- Do not use this device on patient's incapable of communicating physical discomfort.
- Never allow the bare foot to directly contact the innersole.
- Wear a sock to allow the foot to breathe.
- Patient, family member or medical personnel should inspect your feet before and after each use.
- Do not over-inflate aircells. Improper aircell inflation may cause significant skin irritation, especially in persons with diabetic neuropathy. Reduce pressure if you notice any adverse skin changes or reported discomfort.
- Like all lower extremity immobilizers, such as casts or braces, patients without sensation (ie: post-op anesthesia, neuropathies, etc.) should be monitored frequently for skin damage, skin irritation or wound management.
- Use caution when walking on slippery or wet surfaces to avoid injury.
- Do not use over open wounds.
- Do not over tighten straps. This may result in reduction of blood flow or sensation.
- Do not modify the device or use the device other than intended.
- At high altitudes the aircells will expand beyond their optimal level. Adjust aircell support by tightening or loosening straps.
- If you develop a negative reaction and/or experience itchy, red skin after coming into contact with any part of this device, please stop using it and contact your healthcare professional immediately.
- Do not use this device if it is damaged and/or the packaging has been opened.
- If pain, swelling, changes in sensation or other adverse reactions occur while using this product, consult your healthcare professional.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of the device.

APPLICATION INFORMATION:
1) Prepare brace
- Unfasten straps, remove front panel, and open foot flaps and toe cover.
- Put on stocking.

2) Choose an insole
The walker comes with two insoles, a pink Plastazote Insole (comes placed in walker) and an Image Grid Insole (inside accessory bag). The Image Grid Insole allows for removal of pre-cut foam cubes for additional pressure relief. To use the Image Grid Insole, locate and remove the pre-cut foam cubes from the bottom of the pad cover and the wound site (Fig. 1). Remove the pink Plastazote Insole in the walker and replace with the Image Grid Insole (pink side down). Make sure the Image Grid Insole should be against plantar side of foot.

3) Apply brace
- While sitting, place leg in brace and place foot flat on insole with heel in back of brace (Fig. 2).
- Smooth wrinkles in stocking and aircells.
- Wrap foot flaps over foot and toe cover around toes.
- Replace front panel; the lower part inside brace, upper part outside brace (Fig. 3a).
- Secure straps from bottom to top until snug (Fig. 3b).

4) Inflate aircells with Hand Bulb
- Look at Valve Order for appropriate leg and location of valve number one (Fig. 4).
- Firmly insert white tip of clear air tube into valve one.
- Squeeze Hand Bulb until the bottom edge of black Pressure Gauge indicator is above the number 30 (Fig. 5).
- Leave air tube in valve and stop squeezing Hand Bulb — the Pressure Gauge indicator will slowly fall.
- Pull air tube out of valve when the bottom edge of the indicator falls within the correct pressure (Fig. 5).
- Repeat for valves two, and three.

Be sure to check aircell compression with Pressure Gauge whenever brace is adjusted and when leg volume is lightened or loosened.

5) Deflate aircells before removing brace
To deflate, firmly insert black tip of Hand Bulb marked "deflate" in valve and squeeze bulb.

CLEANING INSTRUCTIONS:
The Pneumatic Walker for Diabetics foam liner may be hand-washed in cold water with mild detergent and air-dried. Do not oil in dryer or use other heat source to dry.

REPLACEMENT INSOLES AND STOCKINGS:
The brace insole and stocking should be replaced in conjunction with and/or on the advice of a medical professional and/or clinician. Insoles and stockings are available in the Plastazote Insole Replacement Kit (018R-S, 018R-M, 018R-L) or the Image Grid Insole Replacement Kit (019R-S, 019R-M, 019R-L).

XP DIABETIC WALKER CAN BE LOCKED:
The XP Diabetic Walker can be secured shut with the Aircast Brace-Lok (01P1414) to help ensure optimal progress.

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

Rx ONLY
INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT.
NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THIS DEVICE IS ONLY ONE ELEMENT IN THE OVERALL TREATMENT PROGRAM ADMINISTERED BY A MEDICAL PROFESSIONAL. THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

CAUTION: FEDERAL LAW (U.S.A.) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONER.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

PERFIL DEL USUARIO PREVISTO:
El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente o el cuidador del paciente. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

USO PREVISTO/INDICACIONES:
El sistema de andador Aircast XP para diabéticos está diseñado para proporcionar soporte y protección al pie. Puede ser adecuado para aliviar la carga en la planta del pie y después de una fractura estable del pie y/o tobillo. Proporciona protección y/o inmovilización o movimiento controlado de la extremidad o del segmento corporal.

CONTRAINDICACIONES: Este dispositivo está contraindicado para fracturas inestables de la parte inferior de la pierna, el tobillo y el pie. Embarazo y afecciones circulatorias, pulmonares, cardiovasculares o esqueléticas que tienen riesgo de empeorar como resultado de compresión y/o presión. Si alguna de estas afecciones existe, tal como la artropatía de Charcot (sin relación alguna con la cirugía) u otras anormalidades que hacen que el contorno del pie sea excesivamente anormal. Patologías del pie que necesiten el soporte de las estructuras óseas circundantes.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
- Este dispositivo debe utilizarse bajo la supervisión de un profesional médico. La decisión de aplicar el dispositivo en cada caso concreto, así como la frecuencia y la duración del uso, corresponde exclusivamente al médico tratante. Consulte siempre a su médico antes de efectuar modificaciones al dispositivo.
- No utilice este dispositivo en pacientes incapaces de comunicar su malestar físico.
- Nunca se debe permitir que exista contacto directo entre el pie desnudo y la plantilla.
- Utilice un calcetín que permita la ventilación del pie.
- El paciente mismo, un miembro de su familia o el personal médico debe inspeccionar el pie antes y después de cada utilización.
- No infle demasiado las células neumáticas. Un inflado incorrecto de la celdilla neumática puede irritar considerablemente la piel en pacientes afectados de neuropatía diabética. Reduzca la presión de las celdillas neumáticas si percibe cambios en la piel o si el paciente tiene molestias.
- Al igual que sucede con las escayolas, las sujeciones y demás inmovilizadores de las extremidades inferiores, los pacientes sin sensibilidad (p. ej., anestesia postoperatoria, neuropatías, etc.) deben supervisarse a menudo para detectar daños en la piel, irritación en la piel o heridas.
- Tenga cuidado al caminar sobre superficies resbaladizas o húmedas para evitar lesiones.
- No debe aplicarse sobre heridas abiertas.
- No apriete demasiado las correas. Esto puede reducir el flujo sanguíneo o la sensación.
- No modifique el dispositivo ni lo utilice de forma diferente a la prevista.
- A gran altitud, las celdillas neumáticas se expanden más allá de su nivel óptimo. Ajuste el soporte de las celdillas neumáticas, apretando o aflojando las correas.
- Si tiene una reacción alérgica o experimenta picazón y la piel se enrojece después de entrar en contacto con cualquier parte de este dispositivo, deje de usarlo y póngase en contacto inmediatamente con su profesional de salud.
- No utilice el dispositivo si está dañado y/o si el empaque está abierto.
- Si sufre algún dolor, inflamación, alteración de la sensación o cualquier otra reacción poco favorable al utilizar este producto, consulte a su profesional de salud.

NOTA: Póngase en contacto con el fabricante y con la autoridad competente en caso de producirse un incidente grave como consecuencia del uso de este dispositivo.

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN:
1) Preparar el arnés
- Suelte las correas, quitar el panel delantero y abrir las aletas para el pie y la cubierta para los dedos. • Ponerse la media.

2) Elija una plantilla
El sistema andador viene con dos plantillas, una plantilla rosa de Plastazote (viene colocada en el sistema walker) y una plantilla Image Grid (dentro de la bolsa de accesorios). La plantilla Image Grid permite quitar los cubitos de espuma precortados para un mayor alivio de la presión. Para usar la plantilla Image Grid, localizar y retirar los cubos de espuma precortados de la parte inferior de la almohadilla de espuma protectora y de la herida(s) (Fig. 1). Extraer la plantilla Plastazote rosa del sistema walker y cambiarla por la plantilla Image Grid (con el lado rosa hacia abajo). El lado azul de la plantilla Image Grid debe quedar contra la planta del pie.

3) Colocar el arnés
- En posición de sentado, colocar la pierna en el arnés con el pie plano sobre la plantilla y el talón en la parte posterior del aparato (Fig. 2).
- Alisar las arrugas de la media y de las células de aire.
- Envolver las aletas para el pie sobre éste y la cubierta para los dedos alrededor de los dedos.
- Volver a colocar el panel delantero, con la parte inferior dentro del arnés y la superior fuera del mismo (Fig. 3a).
- Ajustar las correas de abajo arriba. Apriete hasta que queden ajustadas y rígidas (Fig. 3b).

4) Inflar las células de aire con la perilla de mano
- Consultar el Orden de las válvulas para ver cuál es la pierna correcta y la ubicación adecuada de la válvula uno (Fig. 4).
- Insertar con firmeza, en la válvula número uno, la punta blanca del tubo de aire transparente.
- Apretar la perilla de mano hasta que el borde inferior del indicador del manómetro negro esté por encima del número 30 (Fig. 5).
- Dejar el tubo de aire en la válvula y parar de apretar la perilla de mano: el indicador del manómetro irá descendiendo lentamente.
- Sacar el tubo de aire de la válvula cuando el borde inferior del indicador se encuentre dentro del intervalo de presión correcta (Fig. 5).
- Repetir este procedimiento para las válvulas dos, y tres.

Cerciorarse de comprobar la compresión de las células de aire con el manómetro cada vez que se ajuste el arnés o se aligeren o aflojen las correas.

5) Desinflar las celdas de aire antes de quitar el arnés
Para desinflar las celdas de aire, volver a insertar con firmeza en la válvula la punta negra de la perilla de mano marcada "deflate" ("desinflar") y oprimir la perilla.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
El forro de espuma del andador Pneumatic Walker para personas diabéticas se puede lavar a mano en agua fría con detergente suave y se puede secar al aire. No secar con secadora ni utilizar otra fuente de calor para secarlo.

PLANTILLAS Y MEDIAS DE REPUESTO:
Con el médico, o por consejo del mismo, se deberá cambiar la plantilla y la media del arnés. Hay disponibles medias y plantillas adicionales en el kit de recambio de la plantilla Plastazote (018R-S, 018R-M, 018R-L) o el kit de recambio de la plantilla Image Grid (019R-S, 019R-M, 019R-L).

EL XP DIABETIC WALKER CONTIENE CIERRE DE SEGURIDAD:
El XP Diabetic Walker se puede dejar cerrado con seguro con el Aircast Brace-Lok (01P1414) para seguir mejor el progreso del paciente.

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

SÓLO CON RECETA MÉDICA.
DISEÑADO PARA SU UTILIZACIÓN EN UN SOLO PACIENTE.
NO FABRICADO CON LATEX DE CAUCHO NATURAL.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS CON TÉCNICAS AVANZADAS PARA OBTENER LA MÁXIMA COMPATIBILIDAD DE FUNCIONALIDAD, DURABILIDAD DE LA RESISTENCIA Y COMODIDAD, ESTE DISPOSITIVO NO ES MÁS QUE UN ELEMENTO EN EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO GENERAL ADMINISTRADO POR EL PROFESIONAL MÉDICO. NO HAY GARANTÍA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES CON EL USO DE ESTE PRODUCTO.

PRECAUCIÓN: LA LEY FEDERAL (EE.UU.) RESTRINGE LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO POR PARTE DE O A PEDIDO DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN MÉDICA MATRICULADOS.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ANWENDERPROFIL: Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten oder Pflegekräfte des Patienten bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, die Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebrauchsanweisung zu lesen, zu verstehen und körperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN: Das Aircast XP Diabetiker-Gehhilfesystem dient zur Immobilisierung und zum Schutz des Fußes. Es kann zur plantaren Entlastung und nach stabilen Frakturen des Fußes und/oder des Sprunggelenks geeignet sein. Zum leichten Schutz und zur Ruhigstellung oder kontrollierten Bewegung der Extremität oder des Körpersabschnitts.

KONTRAINDIKATIONEN: Diese Vorrichtung ist bei instabilen Frakturen des Unterschenkels, Sprunggelenks und Fußes kontraindiziert. Schwangerschaft sowie Kreislauf-, Lunge-, Herz- und Gefäßkrankheiten oder Erkrankungen des Skelettsystems, bei denen das Risiko besteht, dass sie sich durch Kompression und/oder Druck verschlimmern. Vorliegen von Knochendeformitäten, z. B. nach Operationen (Charcot) oder anderen Missbildungen, aufgrund deren die Form des Fußes erheblich von der Normalform abweicht. Pathologische Erkrankungen am Fuß, die eine Unterstützung der Knochenstrukturen erfordern.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN: Dieses Produkt ist unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft zu verwenden. Die Entscheidung, wann, wie häufig und wie lange das Tragen der Orthese unterbrochen ist, liegt ausschließlich im Ermessen des behandelnden Arztes. Stets den Arzt konsultieren, bevor Modifikationen an der Orthese vorgenommen werden.
- Dieses Produkt darf an Patienten verwenden, die körperliche Beschwerden nicht kommunizieren können.
- Den nackten Fuß nicht in direkten Kontakt mit der Innensohle bringen.
- Einen Strumpf tragen, damit der Fuß atmen kann.
- Die Füße des Patienten sollten vor und nach jeder Verwendung vom Patienten, einem Familienmitglied oder einer medizinischen Fachkraft untersucht werden.
- Die Luftzellen nicht zu stark aufblasen. Eine unzulässige Luftzelleninflation kann insbesondere bei Personen mit diabetischer Neuropathie zu signifikanten Hautreizungen führen. Wenn sichtbare Hautveränderungen auftreten, den Druck verringern, indem Sie Luft ablassen.
- Wie alle Vorrichtungen zur Immobilisierung der unteren Extremitäten, wie z. B. Gipsverbände oder Orthesen, müssen Patienten ohne Empfindungswahrnehmung (z. B. postoperative Narkose, etc.) regelmäßig auf Hautschäden, Hautreizungen und Wundbehandlung untersucht werden.
- Auf rutschigen bzw. nassen Flächen vorsichtig gehen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nicht auf offene Wunden anwenden.
- Die Gurte nicht zu fest anziehen. Andernfalls kann es zu einer Verringerung des Blutflusses oder der Empfindungsvermögens kommen.
- Das Produkt nicht modifizieren oder anders als vorgesehen verwenden.
- In Höhenlagen dehnen sich die Luftzellen über ihren optimalen Pegel hinaus auf. Den Luftzellenhalt durch Festziehen oder Lockern der Klettgurte anpassen.
- Wenn eine allergische Reaktion auftritt und/oder Sie nach Kontakt mit einem Teil dieses Produkts eine juckende, gerötete Haut bemerken, verwenden Sie das Produkt nicht länger und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Dieses Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt und/oder die Verpackung geöffnet wurde.
- Wenn bei der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsänderungen oder andere unvorhergesehene Reaktionen auftreten, nehmen Sie bitte sofort Kontakt mit Ihrem Arzt auf.

HINWEIS: Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

ANWENDUNGSHINWEISE:
1) Orthese vorbereiten
- Die Klettgurte lösen, die Frontschale entfernen und den Polstereinsatz öffnen.
- Den Strumpf anziehen.

2) Eine einlage wählen
Die Orthese wird mit zwei Einlagen geliefert: einer rosafarbenen Plastazote-Einlage (in der Orthese) und einer Image Grid-Einlage (im Zubehörbeutel). Bei der Image Grid-Einlage können vorgeschnittene Schaumstoffwürfel zur Druckentlastung entfernt werden. Die Schaumstoffwürfel an der Unterseite des Schaumstoffpolsters im Bereich der Wundstelle entfernen (Abb. 1). Die rosafarbene Einlage aus der Orthese nehmen und durch die Image Grid-Einlage (rosafarbene Seite nach unten) austauschen. Darauf achten, dass die Einlage auf der Fußsohle des Patienten anliegen.

3) Orthese anlegen
- Den Fuß im Sitzen flach auf der Einlegesohle in der Orthese positionieren, sodass sich der Fuß in der Rückseite der Orthese anliegt (Abb. 2) • Falten im Strumpf und in den Luftzellen glätten.
- Die Fußlaschen über den Fuß und die Zehenabdeckung um die Zehen legen. • Frontschale zusetzen: unterer Teil innerhalb der Orthese, oberer Teil außerhalb der Orthese (Abb. 3a). • Die Gurte von unten nach oben schließen, bis die Orthese fest sitzt (Abb. 3b).

4) Aufpumpen der Luftkammer mit der Handpumpe
- Die Ventilreihenfolge für das jeweilige Bein und die Position von Ventil Nummer 1 beachten (Abb. 4) • Die weiße Spitze des durchsichtigen Luftschlauchs gut in das erste Ventil einstecken. • Pumpen, bis die Unterkante des schwarzen Druckanzeigers die Markierung 30 auf der Skala überschreitet (Abb. 5) • Den Luftschlauch im Ventil lassen und die Handpumpe nicht weiterpumpen. • Der Druckanzeiger sollte langsam fallen. • Den Luftschlauch aus dem Ventil ziehen, wenn die Unterkante des Anzeigers in den korrekten Druckbereich fällt (Abb. 5) • Den Vorgang für die Ventile Zwei und Drei wiederholen.

Sicherstellen, dass der Druck mit dem Manometer jedes Mal mit dem Druckmesser geprüft wird, wenn die Schienen nachgestellt wird und/oder die Gurte fester gezogen oder gelockert werden.

5) Vor Entnahme der Orthese die Luft aus den Luftkammern ablassen
Zum Ablassen der Luft die schwarze Spitze der Handpumpe mit der Kennzeichnung „deflate" in ein Ventil einstecken und die Handpumpe drücken.

REINIGUNGSHINWEISE: Die Schaumstoffeinlage der Pneumatic Diabetiker-Gehhilfe kann in kaltem Wasser mit mildem Reinigungsmittel von Hand gewaschen und an der Luft getrocknet werden. Nicht in einem Wäschetrockner oder durch sonstige Wärmeverfahren trocknen.

ERSATZEINLAGEN UND STRÜMPFE: Die Einlage und der Strumpf der Orthese sollten zusammen mit einem Arzt und/oder auf dessen Rat ersetzt werden. Ersatzstrümpfe und -einlagen sind erhältlich im Plastazote-Einlagen-Ersatzteil (018R-S, 018R-M, 018R-L) oder dem Image Grid Einlagen-Ersatzteil (019R-S, 019R-M, 019R-L).

DER XP DIABETIKER-GEHHILFE KANN ABGESICHERT WERDEN:
Der XP Diabetiker-Gehhilfe kann mit Hilfe des Aircast-Brace-Lok (01P1414) gesichert werden, um die Überwachung des Heilungsfortschritts des Patienten zu unterstützen.

GARANTIE: DJO, LLC garantiert für die Material- oder Herstellungsfehler die Reparatur bzw. den Austausch der kompletten Vorrichtung oder eines Teils der Vorrichtung und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG
ZUR VERWENDUNG AN NUR EINEM PATIENTEN BESTIMMT.
NICHT AUS NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.

HINWEIS: ES WURDEN UNTER ANWENDUNG DER MODERNSTEN VERFAHRENSWEISEN SÄMTLICHE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN, UM DIE GRÖSSTMÖGLICHE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, STÄRKE, HALTBARKEIT UND BEQUEMLICHKEIT ZU ERREICHEN. DIESES PRODUKT IST JEDOCH NUR EIN BESTANDTEIL DES GESAMTEN VON EINEM ARZT DURCHGEFÜHRTEN BEHANDLUNGSPROGRAMMS. DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS STELLT KEINE GARANTIE ZUR VORBEUGUNG VON VERLETZUNGEN DAR.

VORSICHT: NACH US-AMERIKANISCHEM GESETZ DARF DIESE VORRICHTUNG NUR DURCH ODER AUF ANORDNUNG EINES ZUGELASSENEN ÄRZTES BZW. EINER MEDIZINISCHEN FACHKRAFT VERKAUFT WERDEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

PROFILO UTENTE PREVISTO: Il prodotto è destinato a essere utilizzato da un medico professionista, dal paziente o dal caregiver del paziente. L'utente deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente in grado di rispettare tutte le indicazioni, le avvertenze e le precauzioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

USO PREVISTO/INDICAZIONI: Il sistema di calzatura per piede diabetico Aircast XP è progettato per fornire immobilizzazione e protezione al piede. Può essere adatto per la scarico plantare e dopo fratture stabili del piede e/o della caviglia. Fornisce una lieve protezione e immobilizzazione o movimento controllato dell'arto o del segmento del corpo.

CONTROINDICAZIONI: questo dispositivo è controindicato per le fratture instabili della parte inferiore della gamba, della caviglia e del piede. Gravidanza o condizioni circolatorie, polmonari, cardiovascolari o scheletriche a rischio di peggioramento a seguito di compressione e/o pressione. Nel caso di deformazione ossea del piede, come piede di Charcot non operabile o altre anomalie che causino una deviazione eccessiva del piede rispetto alla sua conformazione naturale. Patologie del piede che richiedono un supporto per la struttura ossea.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI:
- Il dispositivo deve essere utilizzato sotto la supervisione di un operatore sanitario. La decisione sull'opportunità o meno dell'applicazione del tutore e su frequenza e durata dell'uso deve essere rigorosamente a discrezione del medico curante. Prima di modificare il tutore consultare sempre il medico curante.
- Non utilizzare il dispositivo su pazienti non in grado di comunicare i propri disturbi fisici.
- Evitare il contatto diretto del piede nudo con il plantare interno.
- Indossare una calza che consenta al piede di respirare.
- Prima di ogni uso il paziente, un familiare o il personale medico, deve controllare le condizioni del piede.
- Non gonfiare troppo le celle d'aria. Un gonfiaggio non corretto delle celle d'aria può causare un'irritazione della cute significativa, specialmente nelle persone affette da neuropatia diabetiche. Ridurre la compressione dei cuscinini d'air dei quo des changements cutanés apparaissent ou qu'une gêne est ressentie.
- Come avec tous les autres dispositifs d'immobilisation des membres inférieurs, tels que plâtres ou attelles, les patients insensibles (c'est-à-dire sous anesthésie postopératoire ou souffrant de neuropathies, etc.) doivent être surveillés fréquemment à la recherche de lésions cutanées, d'irritations cutanées ou pour la gestion des plaies.
- Faire preuve de prudence lors du déplacement sur des surfaces glissantes ou mouillées afin d'éviter toute blessure.
- Ne pas l'utiliser sur une plaie ouverte.
- Ne pas trop serrer les sangles. Cela peut entraîner une réduction du flux sanguin ou de la sensation.
- Ne pas modifier le produit ni l'utiliser autrement que prévu.
- Ne pas l'utiliser à haute altitude car les cellules d'air se dilatent au-delà de leur niveau optimal. Ajuster le support des coussins d'air en serrant ou en desserrant les sangles.
- En cas de réaction allergique et/ou de démangeaisons ou de rougeurs cutanées après tout contact avec une partie quelconque de ce dispositif, cesser de l'utiliser et contacter immédiatement un professionnel de santé.
- Ne pas utiliser ce produit s'il est endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.
- En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou d'autres réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, contacter immédiatement votre professionnel de santé.

REMARQUE : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave survenu dans l'utilisation de ce dispositif.

CONSEILS D'USE :
1) Préparation de l'attelle Défaire les lanières, retirer le panneau antérieur, ouvrir la protection couvrant les orteils et les languettes du pied. • Enfiler la chaussette.

2) Choisir une semelle Le talon d'attelle est rose et muni d'une semelle rose Plastazote (placée préalablement sur le support de marche) et une semelle quadrillée Image Grid (à l'intérieur de la sacoche d'accessoires). Il est possible de retirer des cubes en mousse découpés à l'avance de la semelle quadrillée Image Grid pour soulager davantage la pression. Pour utiliser la semelle quadrillée Image Grid, repérer et retirer les cubes en mousse précédcoupés de bas du tampon autour de ou des sites de la lésion (fig. 1). Retirer la semelle rose Plastazote de support de marche et la remplacer par la semelle quadrillée Image Grid (côté rose vers le bas). Le côté bleu de la semelle quadrillée Image Grid doit se trouver contre le côté plantare du pied.

3) Placer le tutore
- Stando seduti, infilare la gamba nel tutore e appoggiare il piede sulla soletta col tallone nella parte posteriore del tutore (fig. 2). • Appianare le grinze nel calzino e nelle celle d'aria.
- Avvolgere le linguette del piede sul piede e la copertura delle dita attorno alle dita.
- Riposizionare il pannello anteriore: la parte inferiore all'interno del tutore, quella superiore all'esterno del tutore (Fig. 3a).
- Fissare le cinghie dalla parte inferiore a quella superiore fino a quando non siano aderenti (fig. 3b).

4) Gonfiare le celle d'aria con il bulbo manuale
- Osservare l'ordine delle valvole per determinare la gamba appropriata e la posizione della valvola numero uno (fig. 4). • Inserire saldamente la punta bianca del tubo trasparente dell'aria nella valvola uno. • Premere il bulbo manuale fino a quando il bordo inferiore dell'indicatore nero non supera il numero 30 (Fig. 5). • Lasciare il tubo dell'aria nella valvola e smettere di premere il bulbo manuale: l'indicatore del manometro scenderà lentamente. • Estrarre il tubo dell'aria dalla valvola quando il bordo inferiore dell'indicatore rientra entro la pressione corretta (fig. 5). • Ripetere per le valvole due e tre.

Accertarsi di controllare la compressione della cella d'aria col manometro ogniqualvolta il tutore è regolato e/o le cinghie sono strette o allentate.

5) Sgonfiare le celle d'aria prima di rimuovere il tutore
Per sgonfiare, inserire saldamente nella valvola la punta nera del bulbo manuale contrassegnata come di "sgonfiaggio" e premere il bulbo.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: Il rivestimento in schiuma del sistema pneumatico per piede diabetico può essere lavato a mano in acqua fredda con un detergente delicato e asciugato all'aria. Non porta in un essiccatore né utilizzare sorgenti di calore per asciugarlo.

SOSTITUZIONE DI SOLETTE E CALZINI: La soletta e il calzino del tutore devono essere sostituiti in collaborazione con un professionista medico e/o dietro la sua consulenza. Altri calzini e solette sono disponibili nel kit di sostituzione della soletta Plastazote (018R-S, 018R-M, 018R-L) o nel kit di sostituzione della soletta Image Grid (019R-S, 019R-M, 019R-L).

LA CALZATURA PER DIABETICI XP PUÒ ESSERE BLOCCATA: La calzatura per diabetici XP può essere fissata in posizione di chiusura con l'Aircast Brace-Lok (01P1414) per favorire i monitoraggio del progresso del paziente.

GARANZIA: DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali, rinnovati entro sei mesi dalla data di acquisto.

SOLO SU PRESCRIZIONE
IL PRESENTE PRODOTTO È DESTINATO ALL'USO SU UN SOLO PAZIENTE.
NON REALIZZATO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE.

AVVISO- SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO IN GRADO DI OFFRIRE SEMPRE IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E COMFORT, IL PRESENTE DISPOSITIVO RAPPRESENTA SOLO UNO DEGLI ELEMENTI DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO PRESCRITTO DAL MEDICO. NON È POSSIBILE GARANTIRE CHE L'USO DEL PRODOTTO PREVENGA IL VERIFICARSI DI LESIONI.

ATTENZIONE: LA LEGGE FEDERALE STATUNITENSE LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO A PERSONALE MEDICO O PROVVISTO DI PRESCRIZIONE MEDICA.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR VISÉ : Le produit s'adresse à un professionnel de santé agréé, au patient ou à l'aide-soignant. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des consignes, des avertissements et des précautions qui figurent dans la notice d'emploi, et être physiquement apte à les respecter.

UTILISATION/INDICATIONS : Le système de botte de marche Aircast XP pour diabétiques est conçu pour offrir un certain soutien et protéger le pied. Peut être adapté pour la décharge plantaire et après une fracture stable du pied et/ou de la cheville. Il permet une protection légère et une immobilisation ou un mouvement contrôlé du membre ou du segment corporel.

CONTRE-INDICATIONS : Ce dispositif est contre-indiqué pour les fractures instables de la partie inférieure de la jambe, de la cheville et du pied. Grossesse et problèmes circulatoires, pulmonaires, cardiovasculaires ou osseux que la compression et/ou la pression risquent d'aggraver. Déformations osseuses du pied, telle qu'un pied de Charcot non opérable ou toute autre anomalie causant une déviation excessive del piede rispetto alla sua conformazione naturale. Pathologie del piede che richiedono un supporto per la struttura ossea.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :
- Ce produit est destiné à une utilisation sous la surveillance d'un professionnel de santé. La détermination du moment où appliquer l'orthèse ainsi que la fréquence et la durée d'utilisation relèvent de la discrétion exclusive du médecin traitant. Toujours consulter le médecin avant d'apporter des modifications à l'orthèse.
- Ne pas utiliser ce produit sur un patient incapable de communiquer une gêne physique.
- Ne jamais laisser le pied nu entrer en contact direct avec la semelle intérieure.
- Porter une chaussette pour permettre au pied de respirer.
- Le patient, un membre de sa famille ou un membre du corps médical doit inspecter les pieds avant et après chaque utilisation.
- Ne pas gonfler excessivement les coussins d'air. Un gonflage incorrect des coussins d'air peut causer une irritation cutanée importante chez les patients souffrant d'une neuropathie diabétique. Réduire la compression des coussins d'air dès que des changements cutanés apparaissent ou qu'une gêne est ressentie.
- Come tutti gli immobilizzatori per gli arti inferiori, quali ingessature o imbragature, i pazienti privi di sensibilità agli arti (ossia a seguito di anestesia in fase post-operatoria o in caso di neuropatie, ecc.) devono essere sottoposti a controlli frequenti per l'individuazione di eventuali danni cutanei, irritazione della cute o per la cura delle ferite.
- Per evitare lesioni, prestare attenzione mentre si cammina su superfici scivolose o bagnate.
- Non usare su ferite aperte.
- Non stringere eccessivamente le fascette. Ciò può comportare una riduzione del flusso sanguigno o della sensibilità.
- Non modificare il dispositivo né utilizzarlo in modo diverso da quello previsto.
- Ad altitudini elevate le celle d'aria si espandono oltre il livello ottimale. Regolare il supporto delle celle d'aria stringendo o allentando le fascette.
- Se si sviluppa una reazione allergica e/o si manifesta un'eritema cutaneo o prurito si noti un arrossamento della pelle quando è a contatto con qualsiasi parte del dispositivo, interrompere l'uso e rivolgersi immediatamente al medico curante.
- Non utilizzare questo dispositivo se risulta danneggiato e/o la confezione è stata aperta.
- In caso di dolore, gonfiore, variazioni di sensibilità o altre reazioni insolite durante l'uso del prodotto, consultare immediatamente un medico.

NOTA: in caso di grave incidente dovuti all'uso di questo dispositivo, contattare il produttore e l'autorità competente.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE:
1) Preparare il tutore
- Liberare le cinghie, rimuovere il pannello anteriore e aprire le linguette del piede e la copertura della dita. • Indossare il calzino.

2) Scegliere una soletta
Le solette allegate al walker sono due: una soletta rosa Plastazote (inserita nel walker) ed una soletta Image Grid (allegata alla confezione di accessori). La soletta Image Grid consente la rimozione di cubi in schiuma precedentemente tagliati, per un maggiore sollievo dalla pressione. Per utilizzare la soletta Image Grid, individuare e rimuovere i cubi in poliuretano espanso prefagliati dalla base del cuscinetto attorno al sito/i della lesione (fig. 1). Rimuovere la soletta Plastazote di colore rosa dal walker e sostituirla con la soletta Image Grid (lato rosa in basso). Il lato blu della soletta Image Grid de







SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDDA ANVÄNDARE: Den avsedda användaren ska vara en legitimerad läkare, patienten eller patientens anhörigvårdare. Användaren bör kunna läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder i bruksanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER:

Systemet Aircast XP walker för diabetiker är utformat för att immobilisera och skydda foten. Det kan vara användbart för att avlasta tryckare samt efter skador på fotleden och foten och/eller fotleden. Tillhandahåller mått skydd och immobilisering eller kontrollerat rörelsemönster av lemmen eller kroppsdelen.

KONTRAINDIKATIONER: Instrumentet är kontraindicerat för instabila frakturer på underbenet, fotleden och foten. Graviditet och cirkulation, lung-, hjärt- och skelettsjukdomar som kan förvärras som ett resultat av kompression och/eller tryck. Om fotbesvärsdiagnosen är Charcot joint eller Charcot arthropathy, gäller användning av denna tillstånd som kan leda till att fotens form använder i stor grad från dess naturliga form. Fotpatologi som kräver stöd för bensträckaren.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Produkten får enbart användas under överseende av sjukvårdspersonal. Det är utesluten den behandlande läkarens bedömning som avgör när stödet ska appliceras, samt frekvensen och varaktigheten av användningen av stödet. Rådgör alltid med din läkare innan du gör några ändringar av stödet.
- Detta instrument får inte användas på patienter som inte kan meddela fysiskt obehag.
- Låt aldrig den bara foten komma i direkt kontakt med innersulan.
- Använd en strumpa så att foten kan andas.
- Patienten, en familjemedlem eller medicinsk personal bör inspektera fötterna före och efter varje användning.
- Bilda inte upp luftombuna för mycket. Felaktig fyllning av luftkammaren kan förorsaka betydande hudirritation, särskilt på patienter med diabetesneuropati. Vissa tryckare i luftkammaren vid varje syntig hudförändring eller meddelat obehag.
- Som med alla immobiliseringsstöd för lägre extremiteter finns det risk för ödem, gips eller stödskenor, bör patienter utan känsel (t.ex. nedsövda patienter eller operation, neuropatier etc.) övervakas regelbundet av sjukvårdspersonal med avseende på hudskador, hudirritation eller skråldstad.
- Var försiktig när du går på hala eller våta ytor så att du inte skadar dig.
- Använd inte över öppna sår.
- Spänn inte åt remmarna för hårt. Detta kan leda till minskat blodflöde eller nedsatt känsel.
- Ändra inte produkten eller använd den på något annat sätt än det den är avsedd för.
- Vid högs hållet expanderar luftcellerna utöver den optimala nivån. Justera stödet i luftkammarna genom att dra åt eller lossa remmarna.
- Om du får en allergisk reaktion och/eller upplever klåsnade, röd hud efter att ha kommit i kontakt med någon del av detta instrument ska du sluta använda det och kontakta din läkare omedelbart.
- Produkten får inte användas om den är skadad eller defekt och/eller om förpackningen har öppnats.
- Om smärta, svullnad, känselförändringar eller andra oväntade reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare omedelbart.

OBS! Kontakta tillverkaren och behörig myndighet vid allvarligt tillbud i samband med användningen av denna enhet.

ANVÄNDNINGSINFORMATION:

1) Preparera ortosen

- Lossa remmar, ta bort fronten, öppna täckskydd och fotfliskar. - Sätt på en strumpa.

2) Välj en innersula

- Ortosen kommer med två innersulor, en ljusrid Plastazote-innersula (levereras inne i ortosen) och en Impax Grid-innersula (inne i tillbehörspåsen). Impax Grid-innersulan tillåter borttagning av redan utskurna skumklossar för ytterligare tryckindelning. För att använda Impax Grid-innersulan, ta av ljusgrå Plastazote-skyddsplast på ovisidan och placera från bottnen på dynan runt ett eller flera sår (Fig. 1). Avlägsna den ljusrida Plastazote-innersulan från ortosen och ersätt med Impax Grid-innersulan (den ljusrida sidan neråt). Impax Grid-innersulan bör sluta där liggga an mot fotsulan.

3) Anbringa ortosen

- Placera benet i ortosen sittande, med fotsulan på innersulan och hälen stadigt bak i ortosen (Fig. 2).
- Sätta ut vecki i strumpan och i luftcellerna.
- Täck foten med flikarna och tätna med täckskydet.
- Byt ut fronten: ta bort den i ortosen och överdelen på utsidan (Fig. 3a).
- Drag åt remmarna nerifrån och upp tills det känns lagom (Fig. 3b).

4) Fyll luftcellerna med handpumpen

- Titta på ventilindikatorn för avsett ben och placering av ventil nr ett (Fig 4).
- Stick in den lilla spetsen på ventilfönstret i ventil ett.
- Pumpa med bollen tills nedre kanten på den svarta visaren på tryckmätaren ligger över siffran 30 (Fig. 5).
- Lämna bollen kopplad i ventilen och sluta pumpa – visaren på tryckmätaren sjunker sakta.
- Drag ut slangen ur ventilen när nedre kanten på visaren faller inom korrekt tryck (Fig. 5).
- Upprepa med ventil två, och tre.

Kontrollera alltid trycket i luftcellerna med tryckmätaren då ortosen justeras och/eller då remmarna dras åt eller lossas.

5) Töm luftcellerna innan ortosen tas av

- Har du att tomma luftcellerna, tryck in bollens ovans sett på ventilen i ventilen och pumpa.

RENGÖRING:

Valdkerings i pneumatiska walkers för diabetiker kan tvättas för hand i kallt vatten med milt tvättmedel och lufttorkas. Använd inte torktumlare eller annan värmekälla för torkning.

BYTA INNERSULOR OCH STRUMPOR:

Ortosens innersula och strumpor bör bytas i samband med och/eller på inrådan av utbildad sjukhuspersonal. Ytterligare strumpor och innersuler finns i Plastazote utbytessät för ina innersula (OIR-S, OIR-M, OIR-L) eller i Impax Grid utbytessät för innersula (OIPI-S, OIPI-M, OIPI-L).

XP WALKER FÖR DIABETIKER KAN LÅSAS:

XP walker för diabetiker kan låsas med Aircast Brace-Lok (OIP1414) för att kontrollera gångmönstret framsteg.

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

RECEPTBELAGD

AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN ENDA PATIENT.

EJ TILLVERKAD MED NATURGUMMILATEX.

OBS! EMEDAN DET YTTERSTA HAR GJORTS VAD GÄLLER SENASTE TEKNOLOGI FÖR ATT ERHÅLLA MAXIMAL FUNKTIONSKOMPATIBILITET, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, UTGÖR DENNA ANORDNING ENDAST EN BESTÄNDSDEL I DET TOTALA BEHANDLINGSPROGRAMMET SOM UTFÄRDAS AV LÄKAREN. DET FINNS INGEN GARANTI FÖR ATT SKADOR FÖRHINDRAS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT.

VARNING! ENLIGT FEDERAL LAG (USA) FÅR DENNA ANORDNING ENDAST SÄLJAS AV ELLER PÅ ORDINATION AV LEGITIMERAD LÄKARE.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÄJÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET: Käyttäjän tulee olla valtuutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen, potilas tai hänen hoitajansa. Käyttäjän pitää pystyä lukemaan, ymmärtämään ja olemaan fysiologisesti kykenevä noudattamaan käyttöohjeiden lisäksi yhteisiä varoituksia ja huomautuksia.

KÄYTTÖTARKOITUS/KÄYTTÄJÄHEET: Diabeetikoille tarkoitettu Aircast XP -tukikenkäjärjestelmä on suunniteltu pitämään jalka paikallaan ja suojaamaan sitä. Se voi soveltua käytettäväksi myös haavahoidon tarkoituksessa sekä tyhjentämään jalkapohjan ja/tai nilkan stabiilin murtuman jälkeen. Suojaa kevyesti ja pitää raajan tai kehonosan paikallaan tai haittuusa liikkeessä.

VASTA-AIHEET: Tämä laite on vasta-aiheinen säären, nilkan ja jalkaterän epästabiileille murtumille. Raskaus sekä verenkiertohäiriöt, keuhko-, sydän- ja verisuoni- tai luustovaivat, jotka ovat vaarassa vakeutuvia puristuksen ja/tai paineen seurauksena. Jalan haarnaatiokset, koten e-operoitavien Charcot jalka tai muut epämuodostumat, jotka aiheuttavat jalan haarnattavia muutoksia jalan luonnollisessa muodossa. Luurakenteiden takia edellyttää jalan patologia.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET:

- Tämä tuote saa laittaa käyttöön pätevöityneen terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Vain hoitava lääkäri voi päättää tuen käyttämistestä ja käytön toistumistiheydestä ja kestoasta. Pyydä lääkäriltä neuvoa aina, ennen kuin teet tukeen muutoksia.
- Älä käytä laitetta potilailla, jotka eivät kykene viestimään fyysisestä epämukavuuden tunteesta.
- Paljas jalka ei saa koskaan olla suorassa kosketuksessa pohjallisoen.
- Käytä jalan hengittävissä sukissa, jotta mahdollisilta ongelmilta vältyttäisiin.
- Potilaan, perheenjäsenen tai lääkintähenkilöstön tulisi tutkia jalka aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
- Älä täytä ilmatyynyjä liian tiukaan. Ilmatyynyjen vääränlainen täyttäminen saattaa aiheuttaa merkittävää ihoärsytystä, erityisesti diabeetikista neuropatiaa sairastavilla. Vähennä ilmatyynyjen painetta, mikäli esiintyy ihomuutoksia tai epämukavuuden tunnetta.
- Katen kaikkia mutaatioita alarajojen immobilisaatiotäkteitä, koten kipsejä tai tuki käytettäessä, potilaita, joilla on tunto- tai liikkeen kipua (esteroperatiivinen, neuropatiat jne.) tulee tarkkailla säännöllisesti mahdollisten ihovaurioiden, ihon ärtymisen sekä haavan hoidon varalta.
- Liukkailla tai märillä pinnoilla on käveltävä varoen vammojen välttämiseksi.
- Älä käytä avohaavojen päällä.
- Älä kiristä hihnoja liikaa. Tämä voi jättää verenkierron tai tunnon heikkenemiseen.
- Älä muokkaa laitetta tai käytä sitä muuhun kuin käyttötarkoituksen mukaan.
- Ilmatyynyt laajenevat suurissa korkeuksissa optimitasonsa yli. Säädä ilmatyynyjen tukea kiristämällä tai kyssäämällä hihnoja.
- Jos saatat kokea allergisen reaktion ja/tai ihosi kutisua ja punoittua koskettuaan tämän laitteen mihin tahansa osaan, lopeta sen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut ja/tai jos pakkaus on avattu.
- Ota välittömästi yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos tämän tuotteen käytön yhteydessä esiintyy kipua, turvotusta, tuntomuutoksia tai muita epätavallisia reaktioita.

HUOMAUTUS: Ilmoita tämän laitteen toimivuuteen ja toimivallassa olevan maan, jos tämän laitteen käyttö aiheuttaa vakavan haittatapahtuman.

PUKEMISOHJEET:

1) Tuen valmistelu

- Avaa hihnat, poista etuliep ja avaa varvassuoja ja jalkapäl.
- Vedä sukka jalkaan.

2) Sisäpohjasta valitseminen

Kävelytuen mukana toimitetaan kaksi sisäpohjaa, vaaleanpunainen Plastazote-sisäpohja (valmiina kävelytuessa) ja Impax Grid -sisäpohja (lisävarustepussissa). Impax Grid -sisäpohjan mukana on valmiiksi leikattuun vaahtomuovikerrokseen poistettavissa painen vähentämistesiä. Impax Grid -sisäpohjan käyttö paikanna ja irrota valmiiksi leikatut vaahtomuovikuostet tyynyn pohjasta haavan ympärillä (kuva 1). Poista vaaleanpunainen Plastazote-sisäpohja ja vaihda sen tilalle Impax Grid -sisäpohja (vaalearpunainen puoli alaspäin). Impax Grid -sisäpohjan sinisen puolen tulee olla jalkapohjaa vasten.

3) Tuen asettelu

- Aseta istuvaan asentoon ja aseta jalka tuken jalkaterä tasaisesti sisäpohjan päälle ja kantapää tuen takaosassa (kuva 2).
- Taseita sukassa ja ilmatyynyissä olevat ryppyt.
- Kääri jalkalipäät jalan päälle ja varvassuoja varpaiden ympärille.
- Aseta etulievy takaisin alaosa tuen sisä- ja yläosa tuen ulkopuolelle (kuva 3a).
- Kiinnitä hihnat alhaalta ylös tukevasti (kuva 3b).

4) Ilmatyynyn täyttö käsipumpulla

- Katso venttiilijärjestys kiisitellätävälle jalalle ja venttiilin nro 1 sijainti (kuva 4).
- Työnnä kirkkaan ilmaletkun valkoinen kärki venttiilin nro 1.
- Pumista käsipumppua, kunnes mittari osoittaa painemittarin alareuna on numeron 30 yläpuolella (kuva 5).
- Jätä ilmaletku venttiiliin ja lopeta käsipumpun puristaminen — painemittarin ilmaisin laskee kohti lukemia 30.
- Vedä ilmaletku pois venttiilistä, kun ilmaisimen alareuna laskee oikealle painealueelle (kuva 5).
- Toista sama venttiilille kaksi ja kolme.

Tarkista ilmatyynyjen kompressio painemittarilla aina, kun tukea säädetään ja/tai tuen hihnoja kiristetään tai löystätään.

5) Ilmatyynyjen tyhjennys ennen tuen irrotusta

Tyhjennä työntämällä käsipumpun musta kärki (merkintä "deflate") venttiiliin ja purista pumppua.

PUHDISTUSOHJEET:

Diabeetikoille tarkoitetun pneumaattisen tukikengän vaahtomuovilaineri voidaan pestä käsin kylmässä vedessä miedolla pesuaineella ja jättää kuivumaan ilmavirtaan. Älä käytä kuivattamiseksi tai muuta lämmönlähdettä.

VAIHTOSISÄPOHJAT JA -SUKAT:

Tuen sisäpohja ja sukka on vaihdettava yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja/tai tämän ohjeiden mukaisesti. Lisäsukkia ja sisäpohjia on Plastazote-sisäpohjan vaihtopakkauksessa (OIR-S, OIR-M, OIR-L) tai Impax Grid -sisäpohjan vaihtopakkauksessa (OIPI-S, OIPI-M, OIPI-L).

DIABEETIKOILLE TARKOITETTU XP-TUKIKENKÄ VOIDAAN LUKITA:

Diabeetikoille tarkoitettu XP-tukikenkä voidaan lukita Aircast Brace-Lok (OIP1414) -tuotteella, jotta potilaan edistymistä on helpompi seurata.

TAKUU: DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.

VAIN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ

VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTTÖÖN.

VALMISTUKSESSA EI OLE KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA.

HUOMAUTUS: TÄMÄ LAITE ON VALMISTETTU VIIMEISTEN MENETELMIEN MUKAAN MAHDOLLISIMMAN TOIMIVUUDEN, KESTÄVYYDEN JA MUKAVUUDEN KÄYTTÄÄ. SE ON KUITENKIN VAIN YKSI OSA LÄÄKINNÄLLISEN AMMATTIHENKILÖN ANTAMASTA HOITO-OHJELMASTA. MITÄÄN TAKUUTA EI OLE SIITÄ, ETTÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄTTÄESSÄ VÄLTTYTÄISIIN VAMMOILTA.

HUOMAUTUS: YHDYSVALTAIN LIITTOVALTION LAIN MUKAAN TÄMÄN LAITTEEN SAA MYYDÄ AINOASTAAN LÄÄKÄRI TAI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE: Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licencí, pacient nebo pacientův pečovatel. Uživatel musí být schopen přečíst veškeré pokyny, varování a upozornění v návodu k použití a porozumět jim a musí být fyzicky schopen je dodržovat.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE: Diabetická chodicí ortéza Aircast XP je určena k zajištění imobilizace a ochrany chodidla. Lze ji použít ke snížení zátěže plantární fascie a pe chůzi a/nebo k podpoře při hojení ran. Poskytuje částečnou ochranu a dále imobilizaci nebo řízení pohybu končetiny nebo části těla.

KONTRAINDIKACE: Tento prostředek je kontraindikován u nestabilních fraktur dolní části nohy, kotníku a chodidla. Těhotenství a onemocnění oběhová, plicní, kardiovaskulární nebo kostermí, při nichž může dojít ke zhoršení vlivem kompresy a/nebo tlaku. Přítomnost kostních deformit chodidla, jako např. neoperovatelní Charcotova kloubní onemocnění nebo artropatie, při kterých dochází k rozsáhlým změnám chodidla od fyziologických pomě. Patologie chodidla vyžadující podporu kostních struktur.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- Tento prostředek smí být používán pouze pod dohledem zdravotnického pracovníka. Lékaře použití ortézy a frekvenci i trvání jejího užívání je zcela na rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Před provedením jakýchkoli úprav ortéze se vždy poraďte se svým lékařem.
- Tento prostředek nepoužívejte u pacientů, kteří nejsou schopni sdělit, že pociťují fyzické nepohodlí.
- Za všech okolností zabraňte přímému kontaktu holého chodidla s vložkou obuvi.
- Používejte pouze bavlněné ponožky, aby mohlo chodidlo odvádět pot.
- Před každým použitím a po něm musí být chodidla prohlédnuta pacientem, rodinným příslušníkem nebo zdravotnickým personálem.
- Vzduchové komory nenafukujte příliš. Nesprávné nafukování vzduchových komor může způsobit závažné podráždění pokožky, zejména u pacientů s diabetickou neuropatií. V případě viditelných změn na pokožce nebo výskytu nepohodlí tlak vzduchových komor snižte.
- Obdobně jako u všech imobilizačních prostředků pro dolní končetiny, jako jsou sádrové obvazy nebo ortézy, je nutné pacienty bez hmatové citlivosti (např. popearační anestezie, neuropatie apod.) pravidelně kontrolovat kvůli poškození či podrážděním pokožky a v rámci hojení rány.
- Při chůzi na kluzkém nebo mokrém povrchu buďte opatrní, abyste se nezranili.
- Nepřikládejte na otevřené rány.
- Popruhy nadměrně neutahujte. Mohlo by dojít k omezení průtoku krve nebo ke změně citlivosti.
- Prostředek neupravujte ani jej nepoužívejte k jinému účelu, než je určeno.
- Je-li vzduchová komora při kvalitní správné výšce, nemusí být v rámci optimální úrovně. Podle potřeby tlak ve vzduchových komorách upravte nebo uvolněním pásků.
- Pokud se u vás po kontaktu s kteroukoli částí tohoto prostředku objeví alergická reakce a/nebo svědění či zarudnutí kůže, přestaňte prostředek používat a okamžitě se obraťte na zdravotnického pracovníka.
- Nepoužívejte prostředek, je-li poškozen a/nebo byl-li jeho obal otevřen.
- Pokud se během používání tohoto výrobku objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, obraťte se okamžitě na zdravotnického pracovníka.

POZNÁMKA: Veškerá závažná nežádoucí příhoda, ke které dojde v souvislosti s tímto prostředkem, oznamte jej výrobci a příslušnému orgánu.

INFORMACE O APLIKACI:

1) Příprava ortézy

- Uvolněte pásky, sejměte čelní kryt a otevřete klapky chránící chodidlo a kryt prstů.
- Nasaďte si ponožku.

2) Zvolte vložku do obuvi

Ortéza se dodává se dvěma vložkami, růžovou vložkou Plastazote (je dodávána vložená do chodidla) a vložkou Impax Grid (uvnitř sáčku s příslušenstvím). Prostřednictvím vložky Impax Grid lze odstranit předem vyříznuté pěnové kostky a zajistit tak větší úlevu v místě rány. Chcete-li použít vložku Impax Grid a odstranit předem vyříznutou pěnovou kostku z chodidla a nahradte ji vložkou Impax Grid (růžovou stranou dolů). Modrá strana vložky Impax Grid by měla být proti chodidlu pacienta.

3) Nasaďte ortézu

- Vsaďte vložte nohu do ortézy a položte chodidlo na stélku s patou usazenou v zadní části ortézy (obr. 2).
- Uhlaďte veškeré záhyby na ponožce a na vzduchových polštářcích.
- Přehněte klapky přes chodidlo a kryt přes prsty.
- Nasaďte čelní kryt tak, aby jeho dolní část byla v ertéze a horní část mimo ortézu (obr. 3a).
- Upevněte pásky, postupujte zdola nahoru. Utáhněte je tak, aby ortéza dobře přiléhala a byla pohodlná (obr. 3b).

4) Nafoukněte pomocí ruční pumpičky balónkem

K určení správné volby a umístění ventilu číslo jedna se obraťte na schématický obr. Uspořádání ventilů (obr. 4).

- Pevně zavřete bílou část průhledné hadičky ke ventilu číslo jedna.
- Nahlédněte hadičkou až do spodní okraj černé značky tlakoměru pomocí ručičky. Stiskněte a uvolněte pumpičku tolikrát, až se spodní okraj černé značky tlakoměru dostane nad číslo 30 (obr. 5).
- Ponechte hadičku ve ventilu a přestaňte nafukovat. Značka tlakoměru bude pomalu klesat.
- Vytáhněte hadičku z ventilu, jakmile spodní okraj značky tlakoměru klesne na správnou hodnotu (obr. 5).
- Totéž opakujte u zadního čísla dvě, a tři.

Tlak v polštářku zkontrolujte tlakoměrem při každém upravení ortézy a utažení či povolení pásků.

5) Před sejmutím ortézy vzduch z polštářků vypusťte

Chcete-li vzduch z polštářků vypustit, zavřete pevně černý konec nafukovacího balónku – označený slovem „Deflate" do ventilu a stiskněte balónek.

ČIŠTĚNÍ: Pěnovou vložku pacientské chodicí ortézy pro diabetiky lze ručně prát ve studené vodě s použitím jemného saponátu a usušit na vzduchu. Nesušte v sušičce ani jiných zdrojů tepelných zdrojů.

NÁHRADNÍ VLOŽKY A PONOŽKY: Vložku ortézy a ponožku je třeba vyměňovat za asistence zdravotnického personálu nebo dle jeho pokynů. Další ponožky a vložky jsou dostupné v náhradní soupravě vložky Plastazote (OIR-S, OIR-M, OIR-L) nebo v náhradní soupravě vložky Impax Grid (OIPI-S, OIPI-M, OIPI-L).

O XP DIABETIC WALKER PODE SER FECHADO: O XP Diabetic Walker pode ser fechado com o fecho Aircast Brace-Lok (OIP1414) para auxiliar a monitorizar o progresso do doente.

GARANTIA: A DJO, LLC reparará ou substituirá toda a unidade, ou parte da mesma, e os seus acessórios devido a defeitos de materiais ou de fabrico durante um período de seis meses a partir da data da venda.

SUJEITO A RECEITA MÉDICA

CONCEBIDO PARA UTILIZAÇÃO NUM ÚNICO PACIENTE.

NEOBSAHUJE PŘÍRODNÍ PRYŽOVÝ LATEX.

DŮLEŽITÉ: V RÁMCI SNAHY O NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ ÚROVNI FUNKČNÍ KOMPATIBILITY, PEVNOSTI, TRVANLIVOSTI A POHODLÍ , TOTO ZAŘÍZENÍ JE POUZE JEDNÍM ELEMENTEM V CELÉM LÉČEBNÉM PROGRAMU PROVÁDĚNÉM ZDRAVOTNICKÝM PROFESIONÁLEM. NEEXISTUJE PROTO ZÁRUKA, ŽE PŘI POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNÍTE PORANĚNÍ.

POZOR: FEDERÁLNÍ ZÁKONY USA OMEZUJÍ PRODEJ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NA LICENCOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA NEBO NA JEHO PŘEDPIS.

PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRÉCTO DO DISPOSITIVO.

PERFIL DO UTILIZADOR PREVISTO: O utilizador previsto deverá ser um profissional médico licenciado, o paciente ou o prestador de cuidados do paciente. O utilizador deve conseguir ler, compreender e ser fisicamente capaz de seguir as instruções, advertências e cuidados mencionados nas informações de utilização.

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES: O sistema do Andarilho para Diabéticos Aircast XP foi concebido para proporcionar imobilização e protecção do pé. Pode ser adequado para alívio da carga plantar e na seguência de uma fractura estável do pé e/ou da tornozelo. Assegurar a imobilização ou o movimento controlado do membro ou segmento do corpo.

CONTRA-INDICAÇÕES: Este dispositivo é contra-indicado para fracturas instáveis da parte inferior da perna, tornozelo e pé. Gravidez e patologias do sistema circulatório, pulmonares, cardiovasculares ou esqueléticas que possam piorar como resultado de compressão e/ou pressão. Se o pé apresentar deformações ósseas, tais como Charcot com associada a qualquer cirurgia ou outras anormalidades que possam alterar a forma normal do pé. Patologias do pé que necessitem de suporte das estruturas ósseas.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: - Este produto destina-se a ser utilizado sob a supervisão de um profissional de saúde. A decisão de quando aplicar o imobilizador e da frequência e duração da utilização deverá ficar estritamente ao critério do médico. Consulte sempre o seu médico antes de fazer alterações no imobilizador.

- Não utilize este dispositivo em pacientes incapazes de comunicar desconforto físico.
- Nunca permita o contacto directo do pé no com a palmilha.
- Calce uma peúga para que o pé possa respirar.
- O pé do paciente deverá ser inspeccionado pelo próprio, por um familiar ou pelo pessoal médico antes e após cada utilização.
- Não insufle excessivamente as células pneumáticas. A insuflação incorrecta das células pneumáticas pode causar irritação cutânea significativa em pacientes com neuropatia diabética. Diminua a compressão das células pneumáticas se detectar qualquer alteração visível da pele ou sinais de desconforto.
- Como com todos os imobilizadores dos membros inferiores, como os aparelhos de imobilização ou as ortóteses, os pacientes sem sensibilidade (ou seja, anestesia pós-operatória, neuropatias, etc.) devem ser monitorizados com frequência quanto a "manchas queimadas", irritação cutânea ou ao que respeita aos cuidados da ulceração.
- Tome precauções ao andar em superfícies escorregadias ou molhadas para evitar lesões.
- Não aplique sobre feridas abertas.
- Não aperte demasiado as correias. Isto pode resultar na redução do fluxo sanguíneo ou da sensibilidade.
- Não modifique o dispositivo nem o utilize de outra forma que não a prevista.
- A altitudes elevadas, as células pneumáticas expandem-se para além do seu nível ideal. Ajuste o suporte das células pneumáticas apertando ou desapertando as correias.
- Se desenvolver uma reacção alérgica e/ou manifestar prurido ou vermelhidão na pele após o contacto com qualquer parte deste dispositivo, interrompa a respectiva utilização e entre imediatamente em contacto com o seu médico.
- Não utilize este dispositivo se estiver danificado e/ou se a embalagem tiver sido aberta.
- Em caso de dor, inchaço, mudanças de sensibilidade ou outras reacções anormais durante a utilização deste produto, consulte imediatamente o seu médico.

NOTA: Contacte o fabricante e a autoridade competente no caso de um incidente grave resultante da utilização deste dispositivo.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO:

1) Prepare a ortese • Descarte as correias, retire a protecção anterior e abra as abas do pé e a cobertura dos dedos. • Ponha a meia.

2) Escolha uma palmilha A ortese vem com duas palmilhas, uma palmilha Plastazote cor-de-rosa (colocada na ortese) e uma palmilha com Impax Grid (dentro do saco de acessórios). A palmilha com Impax Grid permite a remoção dos cubos de espuma pré-cortados para obter alívio adicional de pressão. Para usar a palmilha com Impax Grid, localize e retire os cubos de espuma pré-cortados da parte inferior da almofada à volta dos locais da ferida (Fig. 1). Retire a palmilha Plastazote cor-de-rosa da ortese e substitua-a pela palmilha com Impax Grid (com o lado cor-de-rosa para baixo). O lado azul da palmilha com Impax Grid deve estar contra o lado plantar do pé.

3) Ponha a ortese Na posição sentada, ponha a perna na ortese e assente o pé na palmilha com o calcanhar na parte posterior da ortese (Fig. 2).

- Alise as pregas da meia e das células pneumáticas.
- Enrole as abas do pé à sua volta e a cobertura dos dedos à volta destes.
- Feche a colocar a protecção anterior: a parte inferior no interior da ortese e a parte superior fora da mesma (Fig. 3a).
- Prenda as correias de baixo para cima até ficarem ajustadas e confortáveis (Fig. 3b).

4) Insufle as células pneumáticas com a pêra de mão

- Torne atenção à Disposição das Válvulas no que respeita à perna apropriada e à localização da válvula número um (Fig. 4). • Introduza com firmeza a ponta branca do tubo de ar transparente na válvula número um. • Aperte a pêra de mão até que a parte inferior do indicador preto do manómetro esteja acima do número 30 (Fig. 5). • Deixe ficar o tubo de ar na válvula e pare de apertar a pêra – o indicador do manómetro desce lentamente. • Puxe o tubo de ar rectamente e da válvula quando o bordo inferior do indicador fiver descido e estiver no intervalo de pressões correcto (Fig. 5). • Repita para as válvulas dois, e três.

Certifique-se de que verifica a compressão das células pneumáticas com o manómetro sempre que ajustar ou apertar ou as correias forem apertadas ou desapertadas.

5) Esvazie as células pneumáticas antes de remover a ortese

Para esvaziar as células pneumáticas, introduza com firmeza a parte preta da válvula indicada "deflate" (esvaziar) da pêra de mão na válvula e aperte a pêra.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA: O revestimento de espuma da ortese Pneumatic Walker para diabéticos pode ser lavado à mão em água fria com um detergente suave e seco ao ar. Não o ponha no secador nem utilize qualquer outra fonte de calor para o secar.

SUBSTITUIÇÃO DE PALMILHAS E DE MEIAS: A palmilha e a meia do suporte devem ser substituídas em conjunto com um profissional de saúde ou de acordo com as instruções deste. Meias e palmilhas adicionais estão disponíveis no Kit de Substituição de Palmilhas Plastazote (OIR-S, OIR-M, OIR-L) ou no Kit de Substituição de Palmilhas com Impax Grid (OIPI-S, OIPI-M, OIPI-L).

O XP DIABETIC WALKER PODE SER FECHADO: O XP Diabetic Walker pode ser fechado com o fecho Aircast Brace-Lok (OIP1414) para auxiliar a monitorizar o progresso do doente.

GARANTIA: A DJO, LLC reparará ou substituirá a unidade, ou parte da mesma, e os seus acessórios devido a defeitos de materiais ou de fabrico durante um período de seis meses a partir da data da venda.

SUJEITO A RECEITA MÉDICA

CONCEBIDO PARA UTILIZAÇÃO NUM ÚNICO PACIENTE.

NÃO É FABRICADO COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.

AVISO: EMBORA TENHAM SIDO FEITOS TODOS OS ESFORÇOS EM TERMOS DE TÉCNICAS PARA SE OBTER UMA COMPATIBILIDADE MÁXIMA DA FUNÇÃO, FORÇA, DURABILIDADE E CONFORTO, ESTE DISPOSITIVO É APENAS UM ELEMENTO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO GERAL ADMINISTRADO POR UM PROFISSIONAL MÉDICO. NÃO EXISTE NENHUMA GARANTIA DE QUE NÃO OCORRERÃO LESÕES ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

CUIDADO: A LEI FEDERAL (EUA) SÓ PERMITE A VENDA DESTE DISPOSITIVO POR UM PROFISSIONAL DE SAÚDE LICENCIADO OU SOB RECEITA MÉDICA.

NORSK

FOR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILTENKT BRUKER:

Den tiltenkte brukeren skal være lisensiert helsepersonell, pasienten eller pasientens omsorgsperson. Brukeren skal kunne lese, forstå og være i fysisk stand til å følge anvisningene, advarslene og forholdsreglene som er oppgitt i bruksanvisningen.

TILTENKT BRUK / INDIKASJONER:

Aircast XP Walker-systemet for diabetikere er utformet for å immobilisere og beskytte foten. Det kan være nyttig for å avlaste foten samt ved stabile brudd i fot og/eller ankel. Gir lett beskyttelse, og immobiliserer eller kontrollerer bevegelsene til ekstremiteten eller kroppsdelen.

KONTRAINDIKASJONER: Dette produktet er kontraindisert for ustabile brudd i nedre bein, ankel og fot. Graviditet samt sirkulasjons-, lunge-, hjerte- eller skjelettlidelser som kan forverres som følge av kompresjon og/eller trykk. Uregelmessige beindeformiteter, som ikke-opererbar Charcot eller andre abnormiteter, som fører til at fotens form avviker betydelig fra naturlig form. Fotpatologi som krever støtte for beinstrukturen.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER:

- Dette produktet skal brukes under veiledning av helsepersonell. Det er opp til behandlende lege å avgjøre når og hvor ofte støtten skal brukes. Rådfør deg alltid med legen før du gjør endringer på støtten.
- Bruk ikke denne enheten på pasienter som ikke er i stand til å si ifra hvis de føler fysisk ubehag.
- Noken hud skal aldri bæres innersålen.
- Bruk en strømpe, slik at huden får puste.
- Pasienten selv, et familiemedlem eller helsepersonell skal alltid undersøke foten før og etter bruk.
- Fyll ikke for mye luft i luftcellene. Feil fylling av luftcellene kan føre til betydelig hudirritasjon, spesielt hos pasienter med diabetisk nevropati. Reduser luftcelletrykket ved synlige tegn på endringer i huden eller ved ubehag.
- Som med alle immobiliseringsprodukter for de nedre ekstremitetene